# Maandverslag insectenwerkgroep KNNV Roosendaal juni 2026

## Wildernissen (Putte / Berendrecht)

In het bosrijke natuurgebied De Wildernissen heeft Natuurmonumenten enkele jaren geleden enkele open delen gecreëerd, waar de nachtzwaluw kan broeden. Geleidelijk raakt het open zand begroeid met struikhei en grijs kronkelsteeltje. De nachtzwaluw broedt er inmiddels met succes en door middel van bodemvallen volgen we er de ontwikkeling van de loopkeverfauna. Deze maand bezoeken we het gebied op 3, 14 en 28 juni.
Naast een grote hoeveelheid rupsendoders (met de rups van een nachtpauwoog als slachtoffer), spinnendoders en andere sluipwespen tellen we er deze maand zeventien soorten loopkevers.

## Jagersrust

Tegelijkertijd met de herinrichting van de Kleine Meer zijn ook de voorheen agrarische gronden van het aangrenzende Jagersrust op de schop gegaan. Daarbij heeft Natuurmonumenten twee waterpartijen geschoond en van een nieuwe sliblaag voorzien: het Beldeven (vernoemd naar Piet Belde, rustend landbouwer en voorheen eigenaar van het gebied) en het Leemven.
In het Beldeven monitoren we tweemaal per jaar de aquatische macrofauna, bij het Leemven hebben we op 5 juni een drietal bodemvallen geplaatst, die vervolgens op 16 en 30 juni zijn gecontroleerd. Het Leemven staat dan droog. Aanvullend is met een sleepnet ook gekeken naar insecten, die wat hoger in de vegetatie leven. Dat levert – naast veel andere insecten - ruim twintig soorten wantsen op; de inhoud van de bodemvallen bevestigt de grote soortenrijkdom van deze locatie.
Opvallend is hier de massale aanwezigheid van de bruine glasvleugelwants (*Rhopalus parumpunctatus*) (afbeelding). Deze wants leeft fytofaag in allerlei droge, onbeschaduwde en kruidenrijke graslanden op zandgrond.



## De Kleine Meer

Op verschillende uiteenlopende biotopen in de onlangs heringerichte Kleine Meer zijn met instemming van Natuurmonumenten bodemvallen geplaats met de bedoeling na te gaan hoe de kever- en wantsenfauna van samenstelling evolueert in een periode van vijf jaar na voltooiing van de werkzaamheden.
Op 5, 16, en 30 juni controleren we die bodemvallen. Vooral nabij het Granaatven is de biodiversiteit bijzonder groot.
Op twee plaatsen treffen we in de bodemvallen ook veenmollen aan (*Gryllotalpa gryllotalpa)* (afbeelding). Waarschijnlijk komen overal in het grenspark kleine aantallen veenmollen voor, maar door hun verborgen levenswijze worden ze zelden ontdekt. Inventarisatie van “zingende” veenmollen op avonden in mei geeft een wat vollediger beeld van in elk geval de aanwezigheid van volwassen mannetjes. Maar dan mis je uiteraard de onvolwassen dieren, zoals we die in onze bodemvallen aantreffen, evenals de vrouwtjes die immers evenmin geluid produceren.



Het zingen van de veenmol, feitelijk striduleren, is de geluidsproductie waarbij het mannetje een ronkende, snorrende zang maakt om vrouwtjes te lokken. Dit geluid wordt geproduceerd door de voorvleugels snel langs elkaar te wrijven, vergelijkbaar met het geluid van krekels en sprinkhanen.

## Theodorushaven-Noordland-De Poort (TNP) (Bergen op Zoom)

Op 10 en 24 juni controleren we de bodemvallen, die op een viertal locaties op het bedrijventerrein rondom de Theodorushaven staan opgesteld.
Op 10 juni treffen we in een van onze bodemvallen en rupsklaverwants (*Bathysolen nubilus*) (afbeelding) aan. De rupsklaverwants (als Nederlandse naam zou 'hopklaverwants' wellicht toepasselijker zijn) ís een zuidelijke soort, die in 1935 voor het eerst in ons land is aangetroffen. Nadien is deze wants regelmatig ook op andere plaatsen in Limburg waargenomen, pas na 2008 ziet men de soort ook elders in de zuidelijke helft van ons land. Vooralsnog wordt de soort als (zeer) zeldzaam aangemerkt





Op 10 juni treffen we ook een circa 4 mm groot snuitkevertje aan, dat weliswaar vrij algemeen is, maar dat opvalt door de glinsterende metallic-groene schubben op en onder het lijf: Phyllobius virideaeris (afbeelding)

## Halsters Laag

Op 22 juni tellen we dagvlinders en hommels langs de Boerenputten in het natuurgebied Halsters Laag. Talrijk is er dan het bruin zandoogje. We zien er ook dagpauwogen, hooibeestjes, groot koolwitjes, kleine vuurvlinders, een groot dikkopje en metaalvlindertjes (*Adscita statices*) (afbeelding). Deze laatste doet niet mee voor de telling: het is een dagactieve nachtvlinder.

## Grenspark Kalmthoutse Heide



Op 25 juni zijn we op uitnodiging in de Vroente (Kalmthout) aanwezig  voor deelname aan een workshop over de toekomst van het wandelaanbod binnen het grenspark.
Met de ervaring van andere flora- en fauna-inventariseerders bespreken we interessante locaties, die in wandelroutes zouden kunnen worden opgenomen.